



ROTKLEE (*TRIFOLIUM PRATENSE*)

NEMARO


Ploidie: diploid

Reifegruppe: früh-mittel (4)

Zulassung: seit 1986

Die Vorteile von NEMARO

- › Ausgeglichene & hohe Trockenmasseerträge
- › Ausdauernd
- › **Empfohlen in Nordostdeutschland und Bayern**



Die Eigenschaften von NEMARO

Massenbildung im Anfang	4	gering bis mittel
Neigung zur Auswinterung	5	mittel
Neigung zu Lager	6	mittel bis hoch
Ausdauer	6	mittel bis hoch
Anfälligkeit für Kleekrebs	5	mittel
Anfälligkeit für Stängelbrenner	5	mittel
Anfälligkeit für Mehltau	5	mittel
Rohproteingehalt	5	mittel
Trockenmasseertrag, gesamt	5	mittel
Trockenmasseertrag, 1. Schnitt	5	mittel
Trockenmasseertrag, weitere Schnitte	4	gering bis mittel

(1 = sehr gering, sehr niedrig, sehr früh / 9 = sehr stark, sehr hoch, sehr spät)

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2024 – Futtergräser, Bundessortenamt
Stand: Oktober 2024

Alle Sorteninformationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Trotz aller Sorgfalt kann die SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften der Sorte in der Praxis in jedem Fall wiederholbar / nachvollziehbar sind. Sie können daher nur Entscheidungshilfen darstellen. Die SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG schließt jegliche Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Sorteninformation ergeben, aus.

SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG

Wittelsbacherstraße 15 · 94377 Steinach · DEUTSCHLAND

Telefon +49 9428 94190 · Telefax +49 9428 941930 · info@saatzucht.de · www.saatzucht.de